PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMATICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMATICA
Segundo semestre 2022

Ayudantía 2 - MAT1610

1. Determine, si existe, la ecuación de la(s) asíntota(s) horizontal(es) de la función dada:

(a) $f(x) = \dfrac{\sqrt{4x^2+2020}}{3x-6}$

Note que,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sqrt{4x^2+2020}}{3x-6} \\ &= \frac{\sqrt{4x^2\left(1+\frac{2020}{4x^2}\right)}}{x\left(3-\frac{6}{x}\right)} \\ &= \frac{\sqrt{4x^2}\sqrt{1+\frac{505}{x^2}}}{x\left(3-\frac{6}{x}\right)} \\ &= \frac{2\,|x|\,\sqrt{1+\frac{505}{x^2}}}{x\left(3-\frac{6}{x}\right)} \qquad (\sqrt{x^2}=|x|) \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \lim_{x\to\infty} f(x) &= \lim_{x\to\infty} \frac{2\,|x|\,\sqrt{1+\frac{505}{x^2}}}{x\left(3-\frac{6}{x}\right)} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{2x\sqrt{1+\frac{505}{x^2}}}{x\left(3-\frac{6}{x}\right)} \qquad (|x|=x,\ \text{si } x>0) \\ &= \left(\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{x}\right)\left(\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{1+\frac{505}{x^2}}}{\left(3-\frac{6}{x}\right)}\right) \qquad \text{(Leyes límite)} \\ &= 2\frac{\sqrt{1+0}}{3-0} \qquad \text{(Leyes límite)} \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

y hacia menos infinito, se tiene que

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to-\infty} f(x) &= \lim_{x\to-\infty} \frac{2\,|x|\,\sqrt{1+\frac{505}{x^2}}}{x\left(3-\frac{6}{x}\right)} \\
&= \lim_{x\to-\infty} \frac{2(-x)\sqrt{1+\frac{505}{x^2}}}{x\left(3-\frac{6}{x}\right)} \qquad (|x| = -x, \text{ si } x<0) \\
&= \left(\lim_{x\to-\infty} \frac{-2x}{x}\right)\left(\lim_{x\to-\infty} \frac{\sqrt{1+\frac{505}{x^2}}}{\left(3-\frac{6}{x}\right)}\right) \qquad \text{(Leyes límite)} \\
&= -2\frac{\sqrt{1+0}}{3-0} \qquad \text{(Leyes límite)} \\
&= -\frac{2}{3}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la función $f(x)$ tiene como asíntotas horizontales a las rectas de ecuación: $y = \frac{2}{3}$ e $y = -\frac{2}{3}$

(b) $f(x) = \frac{x^3-x}{x^2-6x+5}$

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to\infty} f(x) &= \lim_{x\to\infty} \frac{x^3-x}{x^2-6x+5} \\
&= \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{x^3-x}{x^2}}{\frac{x^2-6x+5}{x^2}} \\
&= \lim_{x\to\infty} \frac{x-\frac{1}{x}}{1-\frac{6}{x}+\frac{5}{x^2}} \\
&= \infty
\end{aligned}$$

Note que, en el numerador, el $\lim_{x\to\infty} x - \frac{1}{x} = \infty - 0 = \infty$ y, en el denominador, el $\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{6}{x}+\frac{5}{x^2}\right) = 1-0+0 = 1$

Análogamente,

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to-\infty} f(x) &= \lim_{x\to-\infty} \frac{x^3-x}{x^2-6x+5} \\
&= \lim_{x\to-\infty} \frac{\frac{x^3-x}{x^2}}{\frac{x^2-6x+5}{x^2}} \\
&= \lim_{x\to-\infty} \frac{x-\frac{1}{x}}{1-\frac{6}{x}+\frac{5}{x^2}} \\
&= -\infty
\end{aligned}$$

Esto, ya que, en el numerador, el $\lim_{x\to\infty} x - \frac{1}{x} = -\infty - 0 = -\infty$ y, en el denominador, el $\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{6}{x}+\frac{5}{x^2}\right) = 1-0+0 = 1$

Por lo tanto, como ambos límites son no finitos, la función dada no tiene asíntota horizontal.

(c) $f(x) = \frac{-2e^x}{e^x - 5}$

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to\infty} f(x) &= \lim_{x\to\infty} \frac{-2e^x}{e^x - 5} \\
&= \lim_{x\to\infty} \frac{e^x(-2)}{e^x\left(1 - \frac{5}{e^x}\right)} \\
&= \lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{e^x} \lim_{x\to-\infty} \frac{-2}{1 - 5e^{-x}} \\
&= 1 \cdot \lim_{x\to\infty} \frac{-2}{1 - 5e^{-x}} \\
&= \frac{-2}{1 - 0} \\
&= -2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to-\infty} f(x) &= \lim_{x\to-\infty} \frac{-2e^x}{e^x - 5} \\
&= \frac{(-2) \lim\limits_{x\to-\infty} e^x}{\lim\limits_{x\to-\infty} e^x - \lim\limits_{x\to-\infty} 5} \\
&= \frac{(-2) \cdot 0}{0 - 5} \\
&= \frac{0}{-5} \\
&= 0
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la función $f(x)$ tiene como asíntotas horizontales a las rectas de ecuación: $y = -2$ e $y = 0$

2. Estudie si cada uno de los límites indicados existe o no. Si existe, determine su valor, en caso contrario, explique por qué

(a) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{x}{x+\sqrt{x^2+x+2}}$

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to-\infty} \frac{x}{x+\sqrt{x^2+x+2}} &= \lim_{x\to-\infty} \frac{x\left(x-\sqrt{x^2+x+2}\right)}{\left(x+\sqrt{x^2+x+2}\right)\left(x-\sqrt{x^2+x+2}\right)} \\
&= \lim_{x\to-\infty} \frac{x\left(x-\sqrt{x^2\left(1+\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}\right)}\right)}{x^2-\left(\sqrt{x^2+x+2}\right)^2} \\
&= \lim_{x\to-\infty} \frac{x\left(x-(-x)\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}}\right)}{-x-2} \\
&= \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2\left(1+\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}}\right)}{x\left(-1-\frac{2}{x}\right)} \\
&= \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2}{x} \lim_{x\to-\infty} \frac{1+\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}}}{-1-\frac{2}{x}} \\
&= (-\infty)(-2) \\
&= +\infty
\end{aligned}$$

(b) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \dfrac{2\,\mathrm{sen}(x)-\sqrt{2}}{4x-\pi}$

Considerando el cambio de variable $t = x - \frac{\pi}{4}$, entonces se tiene que $x = t + \frac{\pi}{4}$, $t \longrightarrow 0$ conforme $x \longrightarrow \frac{\pi}{4}$ y

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to\frac{\pi}{4}} \frac{2\,\mathrm{sen}(x)-\sqrt{2}}{4x-\pi} &= \lim_{t\to 0} \frac{2\,\mathrm{sen}\left(t+\frac{\pi}{4}\right)-\sqrt{2}}{4\left(t+\frac{\pi}{4}\right)-\pi} \\
&= \lim_{t\to 0} \frac{2\,\mathrm{sen}\left(t+\frac{\pi}{4}\right)-\sqrt{2}}{4t} \\
&= \lim_{t\to 0} \frac{2\,\mathrm{sen}\left(t+\frac{\pi}{4}\right)-\sqrt{2}}{4t} \\
&= \lim_{t\to 0} \frac{2\left(\mathrm{sen}(t)\cos(\frac{\pi}{4})+\mathrm{sen}(\frac{\pi}{4})\cos(t)\right)-\sqrt{2}}{4t} \\
&= \lim_{t\to 0} \frac{2\left(\mathrm{sen}(t)\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cos(t)\right)-\sqrt{2}}{4t} \\
&= \lim_{t\to 0} \frac{\sqrt{2}}{4}\frac{(\mathrm{sen}(t)+\cos(t)-1)}{t} \\
&= \frac{\sqrt{2}}{4}\left(\lim_{t\to 0}\frac{\mathrm{sen}(t)}{t}+\lim_{t\to 0}\frac{\cos(t)-1}{t}\right) \\
&= \frac{\sqrt{2}}{4}(1+0) \\
&= \frac{\sqrt{2}}{4}
\end{aligned}$$

Nota: Otro cambio variable que se puede considerar es $t = 4x-\pi$ y, por lo tanto, $x = \frac{t+\pi}{4} = \frac{t}{4}+\frac{\pi}{4}$.

(c) $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x^2+1}\left(\cos(x)+x^3\,\mathrm{sen}\left(\frac{1}{x}\right)\right)$

Considere el cambio de variable $t = \frac{1}{x}$, entonces se tiene que $x = \frac{1}{t}$, $t \longrightarrow 0^+$ conforme $x \longrightarrow \infty$ y

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x^2+1}\left(\cos(x)+x^3\,\mathrm{sen}\left(\frac{1}{x}\right)\right) &= \lim_{t\to 0^+}\left(\frac{1}{\left(\frac{1}{t}\right)^2+1}\left(\cos\left(\frac{1}{t}\right)+\left(\frac{1}{t}\right)^3\mathrm{sen}\,(t)\right)\right) \\
&= \lim_{t\to 0^+}\left(\left(\frac{t^2}{1+t^2}\right)\left(\cos\left(\frac{1}{t}\right)+\frac{1}{t^3}\,\mathrm{sen}\,(t)\right)\right) \\
&= \lim_{t\to 0^+}\left(\left(\frac{t^2}{1+t^2}\right)\left(\cos\left(\frac{1}{t}\right)+\frac{1}{t^2}\frac{\mathrm{sen}\,(t)}{t}\right)\right) \\
&= \lim_{t\to 0^+}\left(\left(\frac{t^2}{1+t^2}\right)\cos\left(\frac{1}{t}\right)+\left(\frac{t^2}{1+t^2}\right)\frac{1}{t^2}\frac{\mathrm{sen}\,(t)}{t}\right) \\
&= \lim_{t\to 0^+}\left(\left(\frac{t^2}{1+t^2}\right)\cos\left(\frac{1}{t}\right)+\left(\frac{1}{1+t^2}\right)\frac{\mathrm{sen}\,(t)}{t}\right) \\
&= \underbrace{\lim_{t\to 0^+}\left(\frac{t^2}{1+t^2}\right)\cos\left(\frac{1}{t}\right)}_{L_1}+\underbrace{\lim_{t\to 0^+}\left(\frac{1}{1+t^2}\right)}_{L_2}\underbrace{\lim_{t\to 0^+}\frac{\mathrm{sen}\,(t)}{t}}_{L_3}
\end{aligned}$$

Los límites L_2 y L_3 son ambos iguales a 1.

El límite L_1 la función involucra el producto de una función acotada por una función que tiende a cero cuando x tiende a 0^+. Entonces, por el teorema de la compresión (sandwich) el límite existe y vale 0, ya que

$$\begin{aligned} -1 \leq \cos\left(\frac{1}{t}\right) \leq 1 \quad &\Longrightarrow \quad -\frac{t^2}{1+t^2} \leq \cos\left(\frac{1}{t}\right)\frac{t^2}{1+t^2} \leq \frac{t^2}{1+t^2} \qquad \left(\frac{t^2}{1+t^2} > 0\right) \\ &\Longrightarrow \quad -\lim_{t\to 0^+}\frac{t^2}{1+t^2} \leq \lim_{t\to 0^+}\cos\left(\frac{1}{t}\right)\frac{t^2}{1+t^2} \leq \lim_{t\to 0^+}\frac{t^2}{1+t^2} \\ &\Longrightarrow \quad 0 \leq \lim_{t\to 0^+}\cos\left(\frac{1}{t}\right)\frac{t^2}{1+t^2} \leq 0 \end{aligned}$$

entonces, $L_1 = \lim\limits_{t\to 0^+}\cos\left(\frac{1}{t}\right)\frac{t^2}{1+t^2} = 0$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \lim_{x\to\infty}\frac{1}{x^2+1}\left[\cos(x) + x^3\,\mathrm{sen}\left(\frac{1}{x}\right)\right] &= L_1 + L_2 \cdot L_3 \\ &= 0 + 1 \cdot 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

3. Determine si la función $f(x) = \begin{cases} x^2 & si \quad x \leq 1 \\ \cos\left(\pi x + 3\,\text{arc sen}\left(\dfrac{1}{x}\right)\right) & si \quad 1 < x \leq 2 \\ \dfrac{3 - 3\cos(2-x)}{x^2 - 2x} & si \quad x > 2 \end{cases}$

es continua o discontinua en $x = 1$ y si es continua o discontinua en $x = 2$. En caso de discontinuidad, clasifíquela.

Se tiene que $f(1) = 1^2 = 1$,

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 1^-} f(x) &= \lim_{x\to 1^-} x^2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 1^+} f(x) &= \lim_{x\to 1^+} \cos\left(\pi x + 3\,\text{arc sen}\left(\frac{1}{x}\right)\right) \\ &= \cos\left(\pi \lim_{x\to 1^+} x + 3\,\text{arc sen}\left(\frac{1}{\lim\limits_{x\to 1^+} x}\right)\right) \quad (\textit{continuidad}) \\ &= \cos\left(\pi + 3\,\text{arc sen}\,(1)\right) \\ &= \cos\left(\pi + 3\frac{\pi}{2}\right) \\ &= \cos\left(2\pi + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Entonces, $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = 1 \neq \lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = 0$ y, por lo tanto, f tiene una discontinuidad de salto en $x = 1$

Por otro lado,

$$\begin{aligned} f(2) &= \cos\left(2\pi + 3\,\text{arc sen}\left(\frac{1}{2}\right)\right) \\ &= \cos\left(3\,\text{arc sen}\left(\frac{1}{2}\right)\right) \\ &= \cos\left(3\frac{\pi}{6}\right) \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 2^-} f(x) &= \lim_{x\to 2^-} \cos\left(\pi x + 3\,\text{arc sen}\left(\frac{1}{x}\right)\right) \\
&= \cos\left(\pi \lim_{x\to 2^-} x + 3\,\text{arc sen}\left(\frac{1}{\lim\limits_{x\to 2^-} x}\right)\right) \quad (\textit{continuidad}) \\
&= \cos\left(2\pi + 3\,\text{arc sen}\left(\frac{1}{2}\right)\right) \\
&= \cos\left(3\,\text{arc sen}\left(\frac{1}{2}\right)\right) \\
&= \cos\left(3\frac{\pi}{6}\right) \\
&= \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \\
&= 0
\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 2^+} f(x) &= \lim_{x\to 2^+} \frac{3 - 3\cos(2-x)}{x^2 - 2x} \\
&= \lim_{x\to 2^+} \frac{3\,(1-\cos(x-2))}{(x-2)\,x} \qquad (\cos(2-x) = \cos(x-2)) \\
&= 3 \lim_{x\to 2^+} \frac{(1-\cos(x-2))}{(x-2)\,x}
\end{aligned}$$

considerando el cambio de variables $t = x - 2$, se tiene que $x = t + 2$, $t \longrightarrow 0^+$ conforme $x \longrightarrow 2^+$ y

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 2^+} f(x) &= 3 \lim_{t\to 0^+} \frac{(1-\cos(t))}{t\,(t+2)} \\
&= 3 \lim_{t\to 0^+} \frac{(1-\cos(t))}{t} \frac{1}{t+2} \\
&= 3 \lim_{t\to 0^+} \frac{(1-\cos(t))}{t} \lim_{t\to 0^+} \frac{1}{t+2} \\
&= 3 \cdot 0 \cdot \frac{1}{2} \\
&= 0
\end{aligned}$$

Entonces, $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 2^+} f(x) = 0$ y, por lo tanto, $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = 0$. Así,

$$\lim_{x\to 2} f(x) = 0 = f(2)$$

por lo que la función f es continua en $x = 2$.